



עלון לצרכן לפי תקנת הרקמים (תנשירים)

התשמ"ו 1986

התרופה משוקקת ללא מרשם רופא

בטני X טבליות

כל טבליה מכילה:

ביסמוט סאבסיליצילט 262 מ"ג

Bismuth Subsalicylate 262 mg

לפירוט מרכיבים נוספים בתרופה ראה ערך-6 מידע נוסף קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

התרופה מיועדת למבוגרים וילדים מעל גיל 12. מתחת לגיל 12 יש לפנות לרופא.

עלך להשתמש בתרופה בצורה נכונה. היועץ ברקוח אם היך זקוק למידע נוסף. עלך לפנות אל הרופא באם סימני המחלה (סימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים לאחר יומיים. כמו כן יש להפסיק את הטיפול ולפנות מיד לרופא אם השלשול מלווה בחום גבוה, או אם החלו צלולים באוזניים או איבוד שמיעה.

1. למה מיועדת התרופה? התרופה מיועדת להקלה במקרים של שלשול, בחילה, דזים, כאבי בטן ועויתים, קולקל קיבה וקשיים בעיכול. למנעת שלשולים אצל מטילים.

2. לפני שימוש בתרופה:

- אין להשתמש בתרופה אם:
 - ידועה רגישות (אלרגיה) לאחד ממרכיבי התרופה או לסליצילטים.
 - היך נוטל תכשיר אחר המכיל סליצילט ובכלל זה אספירין.
 - היך מתחת לילד 20 וסובל ממחלות המלוות בחום כדוגמת שעת ואבעבעות רחם (מחשש לתסמונת ריי).
 - אתה סובל מכיב קיבה (אולקוס), דימומים, צואה דמית או שחורה.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

לפני התחלת הטיפול יש היוועץ ברופא אם היך סובל או גבלת בעבר מליקוי בתפקוד: מערכת השימיה (כגון אסטמה), הכליה/מערכת השתן, מערכת העיכול (כגון כיב קיבה), מערכת הדם (כגון קרישה וכו'), שגדון (גאט), סוכרת, התייבשות (פה יבש, צמאון, סחרחורת), חום, צואה רירית.

אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או לתקופה ממושכת בלי היוועץ ברופא.

אם היך רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עלך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה.

אין לתת לילדים או למתבגרים לטיפול בבחילות אשר סיבות פגם במבנה מערכת העיכול.

אין להשתמש בתרופה אם סימני המחלה (סימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים לאחר יומיים.

אם בשימוש בתרופה מתרחשים שינויים בהתנהגות המלווים בבחילות ובהקאות, התייעץ עם הרופא כיוון שתסמינים אלו יכולים להיות סימן מקדים למחלת ריי (Reye's syndrome), מחלה נדירה אך חמורה.

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד יש לידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח:

- אספירין אוסליצילטים
- תרופות נגד קרישת דם
- תרופות נגד סוכרת
- תרופות נגד שגדון (גאט) כגון פרוכנידי או סולפיפירזון
- טטרציקלינים (אנטיביוטיקה)
- תרופות לדלקת מפרקים (אסטרטיס)
- שימוש בתרופה ומזון:

ניתן ליטול את התרופה עם או בלי מזון. שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול:

אין לשתות ייתו או משקאות חריפים בתקופת הטיפול עם התרופה.

הריון והנקה:

אם היך בהריון או מניקה, יש היוועץ ברופא לפני השימוש בתרופה.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה:

כל טבליה מכילה 1.14 מ"ג נתון.

3. כיצד תשתמש בתרופה? עלך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם איך בטוח המיטן המקביל בדרך כלל הוא:

מבוגרים וילדים מעל גיל 12: 2 טבליות ניתן לחזור על המנה כל מחצית השעה עד שעה לפי הצורך. עד למקסימום של 8 מנות (16 טבליות) – 24 שעות. ילדים מתחת לגיל 12 שנים: יש היוועץ ברופא.

אם לא חל שיפור במצבך תוך יומיים, או אם השלשול מלווה בחום גבוה יש לפנות לרופא.

אין לעבור את המנה המומלצת אין ללוט! לבלוע את הטבליה ולבלוע מיד.

אם נטלת מנת יתר או אם טבעות בלע ידך מן התרופה, פנה מיד לרופא או לאחד מיון של בית החולים והבא אריות התרופה איתך.

השכחת ליטול תרופה זו בזמן הדרוש, אין ליטול מנה



כפולה. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל היוועץ ברופא. כיצד תוכל לסייע להצלחת הטיפול? במקרה של שלשולים להרבות בשתייה ללא קפאין כדי להתגבר על איבוד נוזלים. אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהיך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם היך זקוק להם. אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברקוח.

4. תופעות לוואי: כמו בכל תרופה, השימוש בבטני X עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

יש להפסיק את השימוש ולפנות מיד לרופא אם מופיעים התסמינים הבאים:

חולשה, עויתות, בעיות בנשימה, שיטוש ראייה, בלבול, צלולים באוזניים או איבוד שמיעה, עצירות חמורה.

יש להפסיק את השימוש ולפנות לרופא בהקדם האפשרי אם:

מופיעים סימנים של מימון יתר כגון נמנום, כאב ראש. במקרה של שלשול המלווה בחום. תרופה זו עלולה לגרום לשינוי בצבע הצואה או הלשון בשניים אלה אין מקום לדאגה.

תופעות לוואי נוספות: עצירות, שלשול, בחילה.

אם אחת התופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעות לוואי שלא הזכרנו בעלון, עלך להתייעץ עם הרופא.

5. איך לאחסן את התרופה? מנע הרעלתו תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

אחסן בטמפרטורה הנמוכה מ-25°C. יש לאחסן באריזה המקורית

6. מידע נוסף: נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

Calcium carbonate, Povidone K-25, Regelatinized Starch, Sodium Starch Glycolate, Hypromellose 4910, Magnesium stearate, Ponceau 4R, Macrogol 6000

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה: אריזה המכילה 20, 30, 50, 60, 10, 15, 20, 27, 30 טבליות בבעב ורוד, עגולות וקומות משי הדגדים.

לא כל גדלי האריזות עשויות להיות משוקקות. שם היצרן ובעל הרישום וכתובתו: כצט עשויות כמיות בע"מ, רחוב הקדמה 3, קריית מלאכי

עלון זה נבדק באושר ע"י משרד הבריאות בתאריך: 01/2015 מספר רישום התרופה בפקטס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 1406531601

לשם הפשוט ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

נشرة طبية للمستعملك بموجب ائقطة الصيئلة (سستضرت 1986)

النواء يسوق من نون وصفة طبية

بتيي X أقرص

كل قرص يحتوي على: بيسموت سبلسيليسيلات 262 مغ

لتفاصيل المركبات الإضافية في النواء راجع البند 6- لمعلومات إضافية

اقرأ النشرة بإمعان حتى نهائيتها قبل استعمالك للنواء. هذه النشرة تحتوي على معلومات ملخصة حول النواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، توجّه لطبيب أو الصيدلي.

النواء مخصص للبالغين والأولاد فوق عمر 12 سنوات. للأولاد تحت عمر 12 سنة، يجب التوجّه إلى الطبيب.

عليك استخدام النواء والشكل الصحيح. فم باستشارة الصيدلي إذا كنت بحاجة إلى معلومات إضافية. عليك التوجّه إلى الطبيب إذا تفاقمت علامات المرض (الأعراض) أو لم تتحسن بعد يومين. كما يجب إيقاف العلاج والتوجّه إلى الطبيب على الفور في حالة الإسهال الذي يرافقه حرارة مرتفعة، طنين في الأذنين أو فقدان السمع.

1. ما هي تأثيرات النواء العلاجية؟ النواء مخصص لتخفيف حالات الإسهال، الغثيان، الغازات، الآم مضع البطن، فساد المعدة وصعوبات في الهضم. لتجنب الإسهال لدى المسافرون.

2. قبل استخدام النواء:

- لا يجوز استعمال النواء إذا:
 - لديك حساسية (حسس) لأحد مركبات النواء أو السليسييلات.
 - تتناول عقار آخر يحتوي على سليسييلات ومن بينها أسبيرين.
 - عراك أقل من 20 وتعاين من أمراض مصحوبة بحرارة مثل الإنفلونزا والجدي (خوفاً من متلازمة راي).
 - تعانين من قرحة هضمية (أولكوس) ،نزيف، براز نموي أو أسود

تحذيرات خاصة مرتبطة باستخدام النواء:

■ قبل بدء العلاج، يجب استشارة الطبيب إذا تعانين أو عانيت في الماضي من خلل في وظيفة: جهاز التنفس (مثل الربو)، الكلى، الكبد، الجهاز التنوّلي، الجهاز الهضمي (مثل القرحة الهضمية)، جهاز الدم (مثل التخثر وما شابه)، النفرس (غوث)، السكري، جفاف (فم جاف،