

2. לפני השימוש בתרופה:

- אין להשתמש בתרופה אם:**
 - אתה רגיש (אלרגי) לאמידרון, לידוד או לכל אחד מהמרכיבים הנספיים אשר מכילה התרופה.
 - הגן ברוביו או מניקה.
 - הגרשת התעלפות, סחרחורת, הרגשת חוץ, חולשה, עייפות מוגזמת, קוצר נשימה, כאבים בחזה, לבולבול או בעיות בזירון.
 - אם הגן חש בתסמינים של ברדיקרדיה עלִיך לפנות מיד לטיפול רפואי.
 - השימוש בתרופה זו עלול לגרום לטיששות הראיה. במקרה זה זה להפסיק את הטיפול ולפנות לרופא מיד.
 - בתקופת הטיפול בהתרופה זו יש לערוך בדיקות דם לשלילת היפוקלמיה, תפקוד הכבד, בלוטת התריס, הריאות (גם לפני תחילת הטיפול) וכן בדיקת עיניים שיגריתית הכוללת פונדוסקופיה, א.ה.ג. (ECG).
- אם אתה לוקח, או אם לוקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי מזונה, רופא תוכל לך לפרט את הרישום הנטועד לשימוש בתרופה:**
 - אין להשתמש אם הגן סובל מליקוי במטבוליזם של גלאקטוז, ספיגה של גלוקוז או גלאקטוז או סוסר באזניים לקטאז.

- לפני הטיפול באמיאורד, היוועץ ברופא שלך אם:**
 - הגן סובל או סבלת בעבר מאי ספיקת לב.
 - הגן סובל או סבלת בעבר מבעיות כבד.
 - הגן סובל או סבלת בעבר מבעיות ריאה או אסתמה.
 - הגן סובל או סבלת בעבר מבעיות ראייה.
 - הגן קשיש, והרופא שלך יצטרך לבצע מעקב צמוד אתר מבעך.
- בגוף המטבל לגורם או דיפיברילטור. הרופא שלך יצטרך לודא כי המכשיר עובד היטב מן קצר לאחר תחילת הטיפול ואו במקרה של שינוי במינון התרופה.
- תרופה זו עלולה לגרום לרגישות מיוחדת בחשיפה לשמש (שיזוף מוגבר) על-כן המנע משישיפה לשמש ודאג להגנה מתאימה – לא לך אמצעי ההגנה מספיקים ולכן יש להיוועץ ברופא לגבי אמצעים ותכשירים מתאימים.
- השלב הראשון של הטיפול (בזמן נטילת המינון ההתחלתי) חייב להיות תחת פיקוח רפואי צמוד. אם הגן רגיש למזון כלשהו או לתרופות לשהי, עלִיך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה. אם הגן עומד לעבור ניתוח (כולל דנטלי) או כל פעולה הכרוכה בהרדמה, יש לדווח לרופא המרדים על נטילת התרופה זו.
- דווחו מקרים של האטה מסוכנת בקצב הלב (ברדיקרדיה) והפרעה בהולכה חשמלית של הלב במסופלים אשר קיבלו אמידרון בשילוב עם תרופות מסוימות (Amravon או sordalid) כלילטיל של הבפטטיסט C. רוב המקרים התרחשו ב-24 שעות ראשונות של הטיפול, אולם חלק מהמקרים התרחשו כשבועיים לאחר תחילת הטיפול. במידה והגן מטופל

- תרופות המפורטות מעלה בפיטוח הC, עדיף להימנע משימוש באמידרון. במידה ואין אופציה טיפולית אחרת, הרופא שלך עלול לאשפז אותך ל-48 שעות ראשונות של הטיפול על מנת לעקוב אחר קצב הלב שלך.
- התסמינים של ברדיקרדיה יכולים לכולל: התעלפות או הרגשת התעלפות, סחרחורת, הרגשת חוץ, חולשה, עייפות מוגזמת, קוצר נשימה, כאבים בחזה, לבולבול או בעיות בזירון.
- אם הגן חש בתסמינים של ברדיקרדיה עלִיך לפנות מיד לטיפול רפואי.
- השימוש בתרופה זו עלול לגרום לטיששות הראיה. במקרה זה זה להפסיק את הטיפול ולפנות לרופא מיד.
- בתקופת הטיפול בהתרופה זו יש לערוך בדיקות דם לשלילת היפוקלמיה, תפקוד הכבד, בלוטת התריס, הריאות (גם לפני תחילת הטיפול) וכן בדיקת עיניים שיגריתית הכוללת פונדוסקופיה, א.ה.ג. (ECG).

אם אתה לוקח, או אם לוקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי מזונה, רופא תוכל לך לפרט את הרישום הנטועד לשימוש בתרופה:

- אין להשתמש אם הגן סובל מליקוי במטבוליזם של גלאקטוז, ספיגה של גלוקוז או גלאקטוז או סוסר באזניים לקטאז.
- לפני הטיפול באמיאורד, היוועץ ברופא שלך אם:**
 - הגן סובל או סבלת בעבר מאי ספיקת לב.
 - הגן סובל או סבלת בעבר מבעיות כבד.
 - הגן סובל או סבלת בעבר מבעיות ריאה או אסתמה.
 - הגן סובל או סבלת בעבר מבעיות ראייה.
 - הגן קשיש, והלופאי שלך יצטרך לבצע מעקב צמוד אתר מבעך.
- בגוף העלולות לגורם או דיפיברילטור. הרופא שלך יצטרך לודא כי המכשיר עובד היטב מן קצר לאחר תחילת הטיפול ואו במקרה של שינוי במינון התרופה.
- תרופות העלולות הארריך את מקעה הQT-ת כגון תרופות לטיפול בזיהומים לדוגמא גלירתרמיצין, ציפרופלוקסצין, ליבופלוקסצין.
- תרופות לטיפול במחלות לב כגון חוסמי ביאת לדוגמא: סוטלול, דיג'סטילס (דיגוקסין).
- תרופות הנקראות חוסמי תעלות סידן לטיפול בתעוקת חזה וביתר לחץ הדם לדוגמא: רופמיל, דיאלתיס.
- תרופות משלשלות כגון: ביסודיל, עלִיסנה.
- תרופות לטיפול ברמות גבוהות של כולסטרול כגון: סימבסטאטין, אטורווסטאטין.
- אמפותריצין B בהזרקה, לטיפול בזיהום פטריתי.
- קורטיקוסטרואידים בנותן דרך הפה.
- תרופות משתנות.
- תרופות להרדמה כללית או מנה גבוה של חמצן בעת ניתוח.
- סטרהוקוסטיד, לטיפול אבחנתי בעיית הרומונאליות.
- טקרולימוס או ציקלוספורין (למניעת דחיית שתלים).
- תרופות לטיפול באין דאגה כגון: סידליניז, טאדאלפיל,

- ורדינפיל.
- מתדון, פנטניל- לטיפול בכאבים.
- מידזולם- לטיפול בחרדה או להרגעה לפני ניתוח.
- קולדיצין לטיפול במחלת השגדון.
- לידוקאין (מאלחש מקומי).
- וופרין- תרופות נגד קרישת דם.
- דאבאגטריל- לידולוד דם.
- פיטאנוין (לעוויתות).
- תרופות לטיפול בגלאוקומה- פילוקרפין.
- סופוסבובר בשילוב עם לדיפאביר או בשילוב עם תרופה אחרת המשמשת לטיפול בדיקת כבד (הפטטיס C).
- אקליטומטרופן (לשיעול).
- דרולסיפטאס (לטיפול בשימנת יתר).
- מוטרקסט.
- כולסטרואמין (להורדת כולסטרול).
- סימטידין (לכיב קיבה).

שימוש בתרופה אמזון

אין לצרוך מיץ אשכוליות בזמן הטיפול בתרופה זו. מיץ אשכוליות עלול להגביר את תסיכוי שלך לחוות תופעות לוואי.

יש לטול את התרופה עם או אחרי הארוחה.

- שימוש בתרופה וצרנית אלכוהול**
 - יש להגביל שתית אלכוהול, כיוון שזה עלול להגביר את הסיכון לפגיעה בכבד שלך.
- הריגון והקנה**
 - אין להשתמש בתרופה אם הגן בהריגן או כאשר אתר מניקה.
- השימוש בשימוש במכונות הרטיבה**
 - זירות בבניגה ברכב ובהפעלת מכונות מסוכנות.
- מידע חשוב על חלק מהתרופות אשר התכשיר מכיל לקטוז ועלול לגרום אלורגיה אנשים הרגישים לקטוז.**
 - כל סבליה מילה 60 מ"ג לקטוז.
- 3. כיצד שתשמש בתרופה?**
 - תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופא.
 - עלִיך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.
 - המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.
 - תרופה זו אינה מיועדת לתינוקות ולילדים.
- מטופלים קשישים:** ייתכן שיוחלט על מינון נמוך יותר של **אמיאורד** במטופלים קשישים. כמו כן, יש לעקוב אחר לחץ דם ובדיקות בלוטת התריס באופן קבוע במטופלים אלה.
- אין לעבור על המנה המומלצת**
 - בלקוח הצורך ניתן לתצות או לרסק את הטבליה.
- בדיקות ומעקב**
 - בתקופת הטיפול בתרופה זו יש לערוך בדיקות דם (לשלילת היפוקלמיה), תפקוד בלוטת התריס, תפקוד הכבד והריאות (גם לפני תחילת טיפול), עיניים (בטיפול ממושך), ECG. כמו כן, הרופא עשוי להפנות אותך לביצוע צילום רנטגן של בית החזה.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מינון של בית חולים והבא את אירזת התופעות איתך. כן, התסמינים למינון יתר עלולים להיות: תחושת סחרחורת, עלילפון או עייפות, לבולבול, דופק איטי, חזק לכבד או הקאות.

אם שכחתי לטול תרופה בזן בזמן הדרוש, אין לטול מנה כפולה. קח את המנה הבאה בזמן המיועד והיוועץ ברופא. יש להמתידי בטיפול פכי שהומלץ על ידי הרופא.

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא או הרוקח.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה ההפרעות בקצב הלב בולבות לרוב.

הלב בולבות לחזור. דבר שעלול להיות מסוכן. אין לטול תרופות בחושך! בדיקו תגיות והמננה בכל פעם שהגן נוטל תרופה. הרכב שקפיים אם הגן הקרן שלהם. אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ אחרות בקצב הלב הטבעי שלך.

4. תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה, השימוש באמיאורד טבליות עלול לגרום לתופעות לוואי. לחלק מהמשמששים, אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מןן.

אמיאורד עלול להישאר בגופך עד לחדש לאחר הפסקת הטיפול, אתה עלול עדיין לסבול מתופעות לוואי בתקופה זו.

יש להפסיק את השימוש ולפנות מיד לרופא או לחדר מינון של בית חולים קרוב אליך, אם הגן סובל מ:

- תגובה אלרגית. סימנים אלורגיה כוללים: פריחה, קושי בנשימה או בבלעיה. נפיחות בעפעפיים, בפנים, בשפתיים, בלוע או בלשון (אנגיואדמה).
- תופעות לוואי המופיעות לעיתים קרובות (**תופעות שמופיעות ב- 1-10 משתמשים מתוך 100**):
 - סימנים המצביעים על זקק לכבד, שעלול להיות מידע מסוכן; הצהבת העור או העיניים המלווה בייאוד בחום, בחילה, חוסר תיאבון, כאבי בטן או חום גבוה.
 - סימנים המצביעים על זיהום ריאתי שעלול להיות מסוכן; קושי בנשימה או תחושת לחץ בבית החזה, שיעול טורדני, ניצפוזים, איבוד משקל וחום.
- תופעות לוואי המופיעות לעיתים רחוקות (**תופעות שמופיעות ב- 1-10 משתמשים מתוך 1,000**):
 - קצב לב לא סדיר בהשוואה למצבך הקודם; מצב זה עלול להוביל להתקף לב.
- תופעות לוואי המופיעות לעיתים נדירות מאוד (**תופעות שמופיעות בפחות ממשמש אחד מתוך 10,000**):
 - איבוד ראייה, טשטוש הראייה, כאב או רגישות בעיניים בעת תזונה שלהן, תופעות אלו עלולות להיות סימנים למחלה בשם "ניורופתיה אופטית".
 - פעילות הלב נחלשות או מפסיקות. יש לפנות מיד לבית חולים.

- יש להפסיק את השימוש ולפנות מיד לרופא, אם הגן סובל מתופעות לוואי הבאות. אתה עלול להזדקק לטיפול דחוף.**
- תופעות לוואי המופיעות לעיתים רחוקות (**תופעות**

שמופיעות ב- 1-10 משתמשים מתוך 1,000):

- חוסר תחושה או חולשה, עקצוצים או צריבה באחד או יותר מחלקי הגוף.

- תופעות לוואי המופיעות לעיתים נדירות מאוד (**תופעות שמופיעות בפחות ממשמש אחד מתוך 10,000**):
- פריחה בעור.
- סימנים המצביעים על בעיה מוחית; כאבי ראש (המתגברים בד"כ בשעות הבוקר או לאחר אמצץ או שיעול), עוויתות, בחילות, התעלפויות, בעיות בראיה ובלבול.

- חוסר תיאום בתנועת הגוף, חוסר יציבות, בעיות בדיבור או דיבור איטי.
- תחושת עלילפון, סחרחורות, עייפות וקוצר נשימה – סימנים העלולים להצביע על האטה בקצב לב (במיחד אצל אנשים מעל גיל 65), או בעיות אחרות בקצב הלב הטבעי שלך.
- שיעול דמי.

תופעות לוואי נוספות המופיעות בשכיחות לא ידועה:

- תעוקת חזה, קוצר נשימה ולקצב לב לא סדיר – סימנים העלולים להצביע על מצב שנקרא Torsade de points.

יש לפנות לרופא בהקדם האפשרי אם הגן סובל מ:
תופעות לוואי המופיעות לעיתים קרובות מאוד (**תופעות שמופיעות ביותר ממשמש אחד מעשרה**):

- ראיית הילה באור מסמוור-או שטטוש בראיה.
- תגובה אלרגית. סימנים אלורגיה כוללים: פריחה, קושי בנשימה או בבלעיה. נפיחות בעפעפיים, בפנים, בשפתיים, בלוע או בלשון (אנגיואדמה).

תופעות לוואי המופיעות לעיתים קרובות (**תופעות שמופיעות ב- 1-10 משתמשים מתוך 100**):

- סימנים המעידים על פעילות יתר של בלוטת התריס; חוסר מוחה, תחושת התרגשות קיצונית, איבוד משקל, הדעה, אי סבלות בחום.
- סימנים המעידים על תת פעילות של בלוטת התריס; עייפות קיצונית, חולשה, עלייה במשקל, אי סבלות בקור, עצירתות וכאבי שרירים.
- רעד, כשאתה מזיז את דברים או הרגלים.
- היפונטמיה בצבע אפור-חול בהלקי עור שהיו חשופים לשמש בעיקר בפנים.

- תופעות לוואי המופיעות לעיתים רחוקות (**תופעות שמופיעות ב- 1-10 משתמשים מתוך 1,000**):
 - התכווציות, קושי או עוויתות בשרירים.
- תופעות לוואי המופיעות לעיתים נדירות מאוד (**תופעות שמופיעות בפחות ממשמש אחד מתוך 10,000**):
 - נפיחות באכפיים.
 - סימנים אדומים בעור, נשירת שיער או ציפורניים.
 - סימנים המעידים על אנמיה: תחושת עייפות, עלילפון, סחרחורת ועור חיוור.
 - סימנים המעידים על בעיות בדם – טרומבוציטופניה: דימום יתר או חגלה ביתר קלות.
 - סימנים המעידים על תסמונת שנקראת: syndrome of inappropriate anti-diuretic hormone secretion (SIADH)- הרגשה כללית לא טובה, לבולבול, חולשה, בחילות, חוסר תיאבון, עצבנות.

יש ליידע את הרופא או הרוקח אם אחת מהתופעות לוואי הבאות מחמירה או שימנכט ליותר ממנה ימים:

- תופעות לוואי המופיעות לעיתים קרובות מאוד (**תופעות שמופיעות ביותר ממשמש אחד מעשרה**):
 - בחילות, הקאות.
 - פגיעה בחוש הטעם.
 - שיניים ברמות אנדמי הכבד בתחילת הטיפול.
 - נטייה לכוחות כתוצאה מחשיפה לשמש.
- תופעות לוואי המופיעות לעיתים קרובות (**תופעות שמופיעות ב- 1-10 משתמשים מתוך 100**):
 - האטה בקצב הלב.
 - הפרעות שינה.
 - סיטו לילה.
- תופעות לוואי המופיעות לעיתים נדירות מאוד (**תופעות שמופיעות בפחות ממשמש אחד מתוך 10,000**):
 - כאב ראש.
 - בעיות בשיווי משקל וסחרחורות – ורטיגו.
 - הפרעות בהשגת או שמירת זקפה או בפליטת זרע.
 - נשירת שיער והתקררות.
 - פריחה בעור.
 - אדמומיות בעור כתוצאה מטיפול הקרנות.

- תופעות לוואי נוספות המופיעות בשכיחות לא ידועה:
 - חול/תרספרדת (אורטיקריה).
 - רגנולומות (גומים אדומים קטנים המופיעים על העור או בתוך הגוף ומזוהים על ידי קרינת X-ray).

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא הזכרנה בעלון, עלִיך להתייעץ עם הרופא. ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי: עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המכסה לטוספ המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור:

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הערעלה! התרופה זו וכל תרופה אחת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הערעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוג המצוי (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חדש. אין לאחסן בטמפרטורה העולה על C 25°.

6. מידע נוספי:

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם: Lactose, Maize starch, Povidone, Magnesium stearate, Colloidal silicone dioxide

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה?
האריזה מכילה 3 מגישות המכילות 10 טבליות בכל מגישה. כל טבליה בקוטם 10 מ"מ, סחורת ריח, קמורה משני הצדדים בטבע לובן-ביזי, עם ספ חציצה.
בלע הרישום וכתובתו:
נצט תעשיות כימיות בע"מ, קריית מלאי.

עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך: 10.2015

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 520723517

לשם הפטנט ולזהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר, על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

