

פריפול טבליות

הרכב:

כל טבליה מכילה: 100 מ"ג ברזל (קומפלקס ברזל III פולימלוטו הידרוקסיד) ו- 0.4 מ"ג חומצה פולית חומרים בלתי פעילים- ראה סעיף 6.

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.

עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. התרופה מיועדת בדרך כלל למבוגרים וילדים מעל גיל 12. מתחת לגיל זה יש להשתמש בטיפות/סירופ. עליך להשתמש בתרופה בצורה נכונה. היועץ ברוקח אם הנך זקוק למידע נוסף.

1. למה מיועדת התרופה?

התרופה מיועדת למניעה וטיפול באנמיה הנובעת מחוסר ברזל. וזומצה פולית כולל במהלך הרינון ובתקופת ההרקה.

קבוצה תרופוטיית: ברזל בשילוב חומצה פולית.

2. לפני שימוש בתרופה:

אין להשתמש בתרופה אם:

- ידועה רגישות (אלרגיה) לחומרים הפעילים או לאחד ממרכיבי התרופה (ראה סעיף 6)
- הנך סובל מאנמיה שאינה מלווה בחוסר ברזל כגון: אנמיה המוליטית (עליה בפירוט תאי הדם האדומים), מחסור בויטמין B12.
- הנך סובל מעודף ברזל בגוף
- הפרעה בשימוש ברזל על ידי הגוף

אזהרות וחידודות לגנועת לשימוש בתרופה:

- יש להיועץ ברופא או ברוקח לפני התחלת הטיפול
- אם הנך סובל מזיהום, גידול או מחסור בויטמין B12 או אם הנך סובל או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד: מערכת העיכול (כגון אולקוס), מערכת הדם (כגון קרישה וכו'), כסרת, בחולים המקבלים עירוי דם חוזרים.
- החמצה הפולית עלולה למסך על חסר בויטמין B12
- ייתכן והצואה התופר ליותר כל בעקבות השימוש בפריפול, עם זאת התופעה איננה מזיקה.
- אם אתה לוקה, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי חזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד יש לידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקה:

• ברזל בהרקה – תוספת של ברזל בהרקה אינה מומלצת.

• תרופות לטיפול באפילפסיה, במיוחד פינטואין. יש לידע על התחלת הטיפול בפריפול.

• כלורופניקול: תרופה בדיוהימים חידקים. מתן שתי התרופות ביחד עלול לגרום לעיכוב השפעה של פריפול טבליות. יש לבצע מעקב.

יש ליטול בתרופה מוזון

יש ליטול את התרופה במהלך או אחרי ארוחה. ניתן לערבב תרופה זו בטרם נטילה עם מיצי פירות וירוקן או מזון תינוקות מזון.

יש להיזהר והנהיג

לא נצפתה השפעה שלילית של פריפול טבליות על העובר או על האישה בזמן הרינון או הנקה עם זאת, אם הנך בהריון או מניקה, חושבת שאת בהריון או מתכננת להיכנס להריון, יש להיועץ עם הרופא או הרוקח (כדי להתאים את המינון)

נהיגה ושימוש במכונית

פריפול טבליות אינו משפיע על יכולת הנהיגה ו/או השימוש במכונית.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

כל טבליה של פריפול מכילה כ- 1.5 מ"ג אספרטם. אספרטם הינו מקור לפנילאלין, ועל כן יש להיועץ ברופא לפני תחילת הטיפול אם הנך סובל מפנילקטוניה (גסגס בייצור אנזים פנילאלינין הפיזיולוגי הגורם להצטברות כמויות גדולות של פנילאלינין).

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח. המינון המקובל בדרך כלל הוא: למבוגרים וילדים מעל גיל 12: למניעת אנמיה: טבליה אחת ביום. לטיפול באנמיה: 3 טבליות ביום במינון חד יומי או במנות מחולקות.

תרופה זו אינה מיועדת בדרך כלל לתינוקות וילדים (בטיפול בתינוקות/ילדים יש להשתמש בסירופ/טיפות).

אין לעבור על המנה המומלצת

ניתן ללעוס או לבלוע את התרופה עם מעט מים. שים לב:

יש להכות פרק זמן עם שתיים לפחות בין נטילת תרופה זו לבין נטילת סוחר חומצה, אנטיביוטיקה מקבוצת הסטרקילינים והקוולונים, דימקפרול (להרלת מתכת) – [מספיק לזכות 24 שעות].

כמה זמן בדרך כלל נמשך הטיפול? תלוי במידת החוסר של הברזל/החומצה הפולית

בדיקות ומעקב: בתקופת הטיפול בתרופה זו יש לערוך בדיקות דם.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן הדרוש, אין ליטול מנה כפולה. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל והיועץ עם הרופא.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא. אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התוויות והמנה בכל פעם שאתך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה, השימוש בפריפול טבליות עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא שימתי תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבל מאף אחת מהן.

יש להפסיק את השימוש בפריפול טבליות ולפנות לרופא בהקדם האפשרי אם מופיעים:

אכזי בטרם נשמה עדים, תגובה אלרגית: פריחה בעור, גירוד, קוצר נשימה

תופעות לוואי המופיעות לעיתים קרובות מאוד (יותר מ 10%): שינוי בצבע הצואה, בשינוי זה אין מקום לדאגה. לצואה כהה אין משמעות קלינית.

תופעות לוואי המופיעות לעיתים קרובות (עד 10%): שלשול, בחילות, הפרעות במערכת העיכול/קשיי עיכול

תופעות לוואי המופיעות לעיתים נדירות (עד 1%): הקאות, עצירות, שינוי בצבע השיניים, כאב ראש

תופעות לוואי נוספות: לחץ בחלק העליון של הקיבה, תחושת שובע.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות הטופס המקוון בקישור הבא:
<http://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic44Omoh.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או לתינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

אין לאחסן בטמפרטורה העולה על 25°C. אחסן באריזה המקורית, במקום חשוך.

מידע נוסף:

נוסף על החומרים הפעילים, התרופה מכילה גם: Dextrates, Polyethylene Glycol 6000, Purified Talc, Aspartame, Magnesium Stearate, Chocolate Essence.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה: אריזה המכילה 20 או 30 טבליות לניסה ארוזים במגשי. כל טבלית פריפול הינה נמוגרת בצבע חום-לבן עם ריח שקולוד.

לא כל גדלי האריזות עשויות להיות משוקקים. **בעל הרישום/היצרן וכותבת:** כצט תעשיית כימיות בע"מ, רח' הקדמה 3, קריית מלאכי

עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך: יוני 2015

מספר רישום התרופה בפקס התרופות הממלכתי: 131-01-30647

משרד הבריאות: לשם הפשוטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

