

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים)

התשמ"ו 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

נוטנסיל טבליטות 10 מ"ג

כל טבליה מכילה 10 מ"ג דיציקלמין

לשימת המרכיבים האלה פעילים - ראה סעיף 6.

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.

עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות

נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא

עלולה להזיק לך אם אפילו אם אל נראה לך כי מלתתם דומה.

התרופה אינה מיועדת לילדים מתחת לגיל ששנים.

1. למה מיועדת התרופה?

התרופה מיועדת לטיפול בשלבים בתסמונת המעי הרגיש

ובפרטיות מעידית בעצבת.

קבוצה תרופוטית: החומר הפעיל שייך לקבוצת

האנטיוכיגריים.

2. לפני שימוש בתרופה:

אין להשתמש בתרופה:

- אם הנך רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל (דיציקלמין) או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6). הסימנים של תגובה אלרגית כוללים: פריחה, קושי בנשימה או בכניסה, נפיחות של השפתיים, הפנים, הגרון או הלשון.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

לפני השימוש בנוטנסיל טבליטות, ספר לרופא אם:

- הנך סובל במרבית (גלאוקומה) - הסימנים כוללים כאב בעיניים המלווה בכפיפה בראייה.
- הנך סובל מערמונית מוגדלת.
- הנך סובל מקשיי עיכול או צרבת הנגרמים כתוצאה מקבע סרעפתי.
- הנך בהריון או חושבת שאת עשויה להיות בהריון.
- הנך מגיפה.

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות

כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך

לרופא או לרוקח.

נטילת נוטנסיל בשילוב עם תרופות אחרות עלולה לפגוע

בפעולת הנוטנסיל על פועלת התרופות האחרות.

שימוש בתרופה ומזון:

יש ליטול את התרופה לפני או אחרי הארוחה.

הריון והנקה:

אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת

הטיפול אם הנך בהריון, מתכננת להרות, מניקה או מתכננת

להניק.

היגיה ושימוש במכונות:

ההשפעה של נוטנסיל טבליטות על יכולת ההיגיה והפעלת

מכונות מסוכנות לא נבדקה במלואה. לכן, אין לנהוג או

להפעיל מכונות מסוכנות בזמן נטילת התרופה, אלא אם

אתה בטוח ששיקול הדעת והקאורדינציה שלך לא הושפעו.

1. מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה:

כל טבליה של נוטנסיל מכילה 112 מ"ג לקטוז.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופא.

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. המינון

המקובל בדרך כלל הוא:

למבוגרים וילדים מעל גיל 12: 1-2 טבליטות, 3 פעמים ביום.

ילדים מגיל ששנים: טבליה 3 פעמים ביום.

אין לבעור על המנה המומלצת.

אין ללעוס! במיקרה הצורך ניתן לרסק את הטבליה.

יש לבלוע את התרופה עם מעט מים.

בדיקות ומעקב:

התרופה עלולה לפגוע בתוצאות של בדיקת הפרשת

חומציות בקיבה.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה,

פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא את

אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן הדרוש, אין ליטול מנה

כפולה. קח את המנה הבאה בזמן המיועד והיוועץ ברופא.

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול

בתרופה ללא התייעצות עם הרופא או הרוקח.

אין ליטול תרופות בחושה! בדוק תהויות והמנה בכל פעם

שחנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ

ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה, השימוש בתרופה עלול לגרום לתופעות

לוואי בחלק מהמשתמשים. אין תיבה למקרא שימת

תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מןן.

יש להפסיק את השימוש בתרופה ולפנות מיד לרופא או

לבי חולים אם מופיע:

תגובה אלרגית חמורה, הסימנים יכולים לכלול: פריחה,

נפיחות של הפנים, השפתיים, הלשון או הגרון, קשיי

נשימה או בליעה.

תופעות לוואי נוספות:

• יובש בפה, צמא.

• סחרחורת.

• עייפות, נמנום.

• ראייה מטושטשת.

• פריחה.

• איבוד תיאבון (אנוקוסיה).

• בחילות, הקאות.

• עצינות.

• כאב ראש.

• כאב או קושי בהטלת שתן.

יש לידע את הרופא אם תופעות אלה מחמירות או נמשכות

יותר מכמה ימים.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אתה מתופעות הלוואי

מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעות לוואי שלא צוינה

בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות

החיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי" עקב טיפול

תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות

(www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על

תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור:

<https://forms.gov.il/globaldata/>

<getsequence/getsequence>.

<asp?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

• מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור

במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות

ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה

מפורשת מהרופא.

• אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה

(exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה

מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

• אחסן בטמפרטורה הנמוכה מ-25°C.

6. מידע נוסף:

נוסף על החומרם הפעילים התרופה מכילה גם:

Lactose, Maize Starch, Povidone, Magnesium

Stearate, Sorbitol Solution 70%

• כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

הטבליטות לבנות, קמורות משני הצדדים.

הטבליטות משפוקות באריזות קרטון המכילה 20 טבליטות

באריזות בליטטר.

• **היצרן/בעל הרישום וכתובת:** כנס עשויית כימיות

בע"מ, רח' הקדמ"ג, 3, קרית מלאכי.

• עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך:

דצמבר 2015.

• מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי

במשרד הבריאות: 117-85-23254

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר.

על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.