



עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו 1986

התרופה משווקת ללא מרשם רופא

**גזים X טבליות 125 מ"ג -
Gazim X tablets 125 mg**

כל טבליה מכילה: 125 מ"ג סימתיקון -
125 mg Simethicone

חומרם בלתי פעילים- ראש סעיף 6.

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

גזים X זו אינו מיועד בדרך כלל לתינוקות וילדים מתחת לגיל 12 שנים. היוועץ ברוקח אם הינך צקוק למידע נוסף. עליון לפנות אל הרופא באם הסימפטומים מחמירים או אינם משתפרים לאחר 14 ימים.

1. למה מיועדת התרופה?

התרופה מיועדת להקלה בנפחות ובגזים במערכת העיכול.

קבוצה תרופוטי: נוגדי גזים

2. לפני השימוש בתרופה:

אין להשתמש בתרופה אם:

- ידועה אלרגיה (רגישות) לחומר הפעיל או לאחד ממרכיבי התרופה (ראה סעיף 6).
- הינך נוטל משלשלים המבוססים על שמן מינרלי (פרפין)

אהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

- אם הינך רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליון להודיע על כך לרופא לפני

נטילת התרופה.

- עליון לפנות אל הרופא באם הסימפטומים מחמירים או אינם משתפרים לאחר 14 ימים.

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד יש ליידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח:

- תרופות לטיפול בהפרעות בבלוטת התריס כגון: לבותירוקסין, גזים X עלול להוריד את כמות לבותירוקסין הנספגת ולהחליש את השפעתה.

שימוש בתרופה ומזון:

יש ליטול את התרופה אחרי ארוחה.

הריון והנקה:

יש להיוועץ ברופא אם הינך בהריון או מניקה.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה:

התכשיר מכיל תערובת סוכרים ועלול לגרום לאלרגיה אצל אנשים הרגישים לסוכרים.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליון לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח. המינון המקובל בדרך כלל הוא:

למבוגרים וילדים מעל גיל 12: 1 – 2 טבליות לאחר הארוחות או לפני השינה בהתאם לצורך.

אין לעבור על יותר מ- 4 טבליות ליממה.

תרופה זו אינה מיועדת בדרך כלל לתינוקות וילדים מתחת לגיל 12 שנים, בשל צורת המתן/ המינון הזמין בצורת מתן זו.

אין ללעוס! לבלוע את התרופה עם מים.

יש ליטול את התרופה אחרי ארוחה.

במידה ויש קושי בבליעה, ניתן לחצות או לכתוש את הטבליה ולבלוע את כל חלקי הטבליה ביחד.

אם נטלת מנת יתר או אם טעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא ארזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן הדרוש, אין ליטול מנה כפולה. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל והיוועץ ברופא.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא. אין ליטול תרופות בחושי! בדיק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך צקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה, השימוש בגזים X טבליות עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

- קלקול קיבה
- שלשול
- בחילות
- עצירות

תגובה אלרגית, התסמינים כוללים: פריחה בעור, גירוי בעור, נפיחות בפנים או בלשון, או קשיי נשימה.

אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא הוזכרה בעלון, עליון להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות הטופס המקוון בקישור הבא:

<http://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic%40mo.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך מנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש. אין לאחסן בטמפרטורה העולה על 25°C.

אחסן באריזה המקורית.

לשימוש עד חודשיים מיום הפתיחה.

6. מידע נוסף:

- נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם: Tribasic calcium phosphate, Dextrates, Microcrystalline cellulose, Sodium starch glycolate, Magnesium stearate, Colloidal silicon dioxide, FD&C blue no.1 lake
- כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה?
- כלבוק זכוכית בנפח 60 מ"ל המכיל 30 טבליות. כל טבליה היא בצורה אובאלית, בצבע כחול דהוי ועם פס חציה.
- בעל הרישום וכתובתו: כצט תעשיות כימיות בע"מ, קרית מלאכי
- שם היצרן וכתובתו: כצט תעשיות כימיות בע"מ, קרית מלאכי
- עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך: 06/2015
- מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 1311330853
- לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

