



עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים)

התשמ"ו 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

אציקלוו-וי 200 מ"ג טבליטות

אציקלוו-וי 400 מ"ג טבליטות

כל טבליה של אציקלוו-וי 200 מכילה 200 מ"ג אציקלוויר (200 mg acyclovir)
כל טבליה של אציקלוו-וי 400 מכילה 400 מ"ג אציקלוויר (400 mg acyclovir)

רשימת הרכיבים הנספגים מפורטת בסעיף 6.

קרא בעיון את העלון על סוד בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע ממציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

- אציקלוו-וי מכילה תרופה הנקראת אציקלוויר. היא פועלת על ידי קטיילה אציקלוו-וי של הגדילה של נגיפים.
- אציקלוו-וי יכולה לשמש ל:
- טיפול באבעבועות רוח ובשבלוקת חגורת.
- טיפול בפצע קור, בהרפס של איברי המין וביהומים אחרים של הרפס סימפלקס.
- מניעת חזרה של זיהומי הרפס סימפלקס בחולים עם מערכת חיסונית בדיהומים.
- מניעת זיהומי הרפס סימפלקס באנשים שהמערכת החיסונית שלהם מופקדת פחות טוב, כלומר הגוף שלהם פחות מסוגל להילחם בדיהומים.

בצורה תרופית: אבטי ויראליים.

2. לפני שימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

אתה רגיש (אלרגי) לאציקלוויר או ואלאציקלוויר או לכל אחד מהרכיבים הנספגים אשר מכילה התרופה (מפורטים בסעיף 6).
אל תיקח אציקלוו-וי אם את חל על-יך. אם אינך בטוח, פנה לרוקח או לרופא שלך לפני נטילת אציקלוו-וי.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

- לפני הטיפול באציקלוו-וי, ספר לרופא אם:
 - יש לך בעיות כליה.
 - אתה בן 65 או יותר.
 - אם אינך בטוח אם אלה חלים עליך, פנה לרוקח או לרופא שלך לפני נטילת אציקלוו-וי.
 - חשוב לשמות הרבה מים בזמן נטילת אציקלוו-וי.
- תרופות אחרות ואציקלוו-וי:**
- אם אתה לוקח, או אם לוקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.
- במיוחד אם אתה לוקח:**
- פרובנציד, טיפול בשידוך.

- סימטין, לטיפול בכיבי קיבה.
- מיקופולאט מופטיל, משמשת למנוע מגופר לדחות את האיברים המשתלמים.

הריון והנקה:

אם הנך בהריון או מניקה, חושבת שאת בהריון או מתכננת להרות, יש להיוועץ ברופא לפני השימוש בתרופה.
מידע חשוב על חלק מהרכיבים של התרופה:
אציקלוו-וי 200 מכילה לטוס. אם נאמר לך על ידי הרופא שיש לך אי סבילות לטוסרים מסוימים, פנה לרופא שלך לפני נטילת תרופה זו.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.

נטילת תרופה זו:

- יש ללקחת תרופה זו דרך הפה.
- אין ללעוס; הטבליה מיועדת לבלוע. אין להצלות/לכתוש/לרסק על מנת ליטול מנה מופחתת. במידת הצורך, ניתן לכתוש/לרסק/להצות את הטבליה על מנת להקל על הבלועה ויש לבלוע מיד את כל החלקים עם מים.
- עליך לוודא שאתה שותה הרבה נוזלים כמו מים במשך הטיפול באציקלוו-וי.
- יש להתחיל ללקחת אציקלוו-וי בהקדם האפשרי.
- המינון של התרופה תלוי בסטה שלשמה אציקלוו-וי ניתנת לך. הרופא שלך ישוחח איתך על זה.
- המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

יתכן שהרופא שלך יתאים עבורך את מינון האציקלוו-וי אם:

- אתה בן 65 או יותר.
- יש לך בעיות כליה. אם יש לך בעיות כליה, חשוב לשתות הרבה מים בזמן שאהה מטופל באציקלוו-וי.

דבר עם הרופא שלך לפני נטילת אציקלוו-וי אם אחד מאלה חל עליך.

אין לעבור על המנה המומלצת.

אם לוקחת בטעות מינון גבוה יותר

אציקלוו-וי אינה מזיקה בדרך כלל, אלא אם לקחת יותר מדי במשך מספר ימים. פנה לרוקח או לרופא שלך אם לקחת יותר מדי אציקלוו-וי. הבא את אריות התרופה איתך.

אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא את אריות התרופה איתך.

אם שכחת ללקחת את התרופה

אם שכחת ללקחת אציקלוו-וי, קח ברגע שאתה זכר. אולם, אם זה קרוב למועד המנה הבאה שלך, דלג על המנה שהומצמה.
אין ללקחת מנה כפולה כדי לפצות על המנה שנשכחה.
יש להמדיד טביטול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אין ללקחת תרופות בחושי! בדוק התוויות והמנה בכל פעם שאתה לוקח תרופה. הרכב משקפים אם אתה צוקק להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימושי בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה, השימוש באציקלוו-וי עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

תגובות אלרגיות (מופיעות בפחות מ-1 מכל 1000 אנשים)

אם יש לך תגובה אלרגית, הפסק לקחת אציקלוו-וי ופנה מיד לרופא. הסימנים יכולים לכלול:

- פריחה, גרד או חרלת (גבשושיות מגרות) על העור שלך.
- נפיחות של הפנים, השפתים, הלשון או חלקים אחרים של הגוף שלך.
- קוצר נשימה, צפצופים או קשיי נשימה.
- התמוטטות.

תופעות לוואי נוספות

תופעות לוואי שכיחות (מופיעות בפחות מ-1 מכל 10 אנשים)

- כאב ראש.
- תחושת סחרחורת.
- בחילה או הקאה.
- שלשול.
- כאבי בטן.
- פריחה.
- תגובה עורית לאחר חשיפה לאור (רגישות יתר לאור).
- גרד.
- תחושת עייפות.
- חום לא מוסבר ותחושת עלפון במיוחד כאשר נעמדים.

תופעות לוואי שאינן שכיחות (מופיעות בפחות מ-1 מכל 100 אנשים)

- פריחה מגרדת דמוית חרלת.
- נשירת שיער.
- תופעות לוואי נדירות (מופיעות בפחות מ-1 מכל 1,000 אנשים)
- השפעות על בדיקות דם ושתיים מסוימות.
- עלייה באנזימים הפועלים בכבד.

תופעות לוואי נדירות מאוד (מופיעות בפחות מ-1 מכל 10,000 אנשים)

- ירידה בספירת תאי הדם האדומים (אנמיה).
- ירידה בספירת תאי הדם הלבנים (לוקופניה).
- ירידה במספר הטסיות (תאים העוזרים לדם להקשר) (תורומבוסטופניה).
- תחושת חולשה.
- תחושת אי שקט או בלבול.
- ערידות.
- הזיות (וראיה או שמיעה של דברים שאינם קיימים).
- פרנסים.
- תחושת נמנמ או ישנוניות רגילה.
- חוסר יציבות בעת הליכה וחוסר קואורדינציה.
- קושי בדיבור.
- חוסר יכולת לחשוב או לשפות בבהירות.
- אובדן הכרה (תרדמת).
- שיתוק של חלק או של כל גופך.
- הפרעות בהתנהגות, דיבור ובתנועות העין.
- קשיין בצוואר ורגישות לאור.

- דלקת בכבד (הפטיטיס).

- הצהבה של עורך החלק הלבן של עיניך (צהבת).
- בעיות כליה בהן אתה נתון מעט שתי או ככלל לא.
- כאבים בבגך התחתון. כאזור הבטן שב ממוקמת הכליה שלך או מעל

אם הריכים שלך (כאב ליליית).

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אתה מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעות לוואי שלא ציניה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על

הקישור "דיווח על תופעות לוואי" עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית

של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון

לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור:

<https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il>

5. אין לך את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ לשהר אריינים והישגי ידם של ילדים ולא תימוקט ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- יש לשאון בטמפרטורה הנמוכה מ- 25°C.

6. מידע נוסף:

- נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

אציקלוו-וי 200 –

Lactose, Microcrystalline Cellulose, Sodium Starch Glycolate, Povidone, Magnesium Stearate.

אציקלוו-וי 400 –

Microcrystalline Cellulose, Sodium Starch Glycolate, Povidone, Magnesium Stearate.

- כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה.
- אציקלוו-וי 200: טבליט לבנות, קמורות משני הצדדים.
- אציקלוו-וי 400: טבליט לבנות, קמורות משני הצדדים עם קו חציה.
- הטבליטות מסופקות באריות קרטון המכילה 100, 70, 60, 30, 20, 10, 2 טבליטות באריזת בליסטר.
- יתכן ולא כל גדלי האריזות ישוקו.
- היצרן/בעל הרישום: כעט תעשיות כימיות בע"מ, קרית מלאכי.
- עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך: 02/2017.
- מספרי רישום התרופות בפקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:
- אציקלוו-וי 200: 1186228104
- אציקלוו-וי 400: 1186328105
- לשם הפשוטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.



LFL 014 03/17