

עלון בלתי תלוי תכנית הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986
התרופה מושקט ללא מרשם הרפא

שם התכשיר וצורתו:

X צרבת

בטעם מנטה

בטעם מלון

טבליות ליעסה

כל טבליה מכילה: 500 מ"ג קלציום קרבונט
Calcium Carbonate 500 mg
(כ-2 מ"ג סידן זמין לטבליה).

חומרים בלתי פעילים - ראה טיפ' 6.

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. בהנחה שאתה לא מביא מידע תמציתי על התרופה, אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. צרבת X מיועדת לילדים מעל גיל 6 שנים. עלך להשתמש בה בצורה נכונה. היועץ ברקוח אם הגך זקוק למידע נוסף. עלך לפנות אל הרופא באם הסימפטומים מחמירים או אינם משתפרים לאחר שבועיים.

אין ליטול צרבת X בו זמנית עם תרופות אחרות כפי שמופיע בטבלת "תגובות בין תרופתיות".

1. למה מיועדת התרופה?

נגד חומציות ותוספת סידן לתזונה.

2. לפני שימוש בתרופה:

- X אין להשתמש בתרופה אם:**
 - ידועה אלרגיה (רגישות) לחומר הפעיל או לאחד ממרכיבי התרופה (ראה טיפ' 6).
 - אתה סובל מבעיות ככליה או כבד, אבנים בכליות או סרקוזיס (מחלה מעוררת ברמות סידן גבוהות בדם), המלווה סידן גבוהות (בדם או בשתן).
 - הגך צורך דיאטה לרת הרחן (פוספט).
 - הגך נוטל גלוקוקורטיקואידים לטיפול במחלת לב כגון דיגוקסין.
 - ישנם סימנים של דלקת התוספתן או דלקת מעיים כגון: כאבי בטן, בחילה או הקאות.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

- **הליעץ הטיפול בתרופה צרבת X** הוא מניעה, סובל/טבלת בעבר מליקיה בתפקוד הכליה/מערבת טבלת, מערכת העיכול, מחלות לב, מחלות לבל/כ"י דם. שרבים בעצמות.

• אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה ממושכת בלי היועץ ברופא.

• אם הגך רגיש למוון כלשהו או לתרופה כלשהו, עלך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה.

X אין אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במויחד יש לידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח:

- תרופות המכילות ברזל, סופסט, מגנזיום, פלואוריד
- דיאטטיים (לבל) - כגון: דיגוקסין
- קורטיקוסטרואידים
- אנטיביוטיקה: סטרציקליניום או פלואורוקונולונים (כגון ציפרופלוקסצין), מתנמיין
- פניטואין (לעיתות)
- ויטמין D או אצב (תוספי תזונה)
- ביספוספונים לטיפול באוסטאופורוזיס
- תרופות שמתגוננות מסוג תאידיים
- ברזל במתן פומי למניעת/טיפול אצמיה
- לבוטרוקסין לטיפול בתת פעילות של בלוטת התריס

• תרופות בצורת טבליה עם ציפוי אנטרי תרופות נגד ספריות כגון סקוונאזול

• סודיום פוליסטרין, סולפונט

• יש להכות פרק זמן של 3 שעות בין נטילת תרופה זו לבין נטילת תרופות אחרות במתן דרך הפה, תכשירי ברזל במתן דרך הפה.

שימוש בתרופה ומזון

- יש להימנע משתיה מפורזת של משקאות המכילים קפאין.
- אין ליטול תרופה זו בו זמנית עם חלב ומוצריו, תרד, דברבר, סובין, מוצרי דגן.

שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול

אין ליטול תרופה זו או משקאות חריפים בצורה מפורזת תוספת הטיפול עם התרופה.

הריון והקנה

יש להיוועץ ברופא לפני שימוש בתרופה אם הגך בהריון או מניקה.

עישון

יש להימנע מעישון מפורז של טבק.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

כל טבליה של צרבת X טבליות ליעסה בטעם מנטה מכילה כ-7 מ"ג אספרטם.

כל טבליה של צרבת X טבליות ליעסה בטעם מלון מכילה כ-4.5 מ"ג אספרטם.

אספרטם הינו מוקד לפניאלגין, ועל כן יש להיוועץ ברופא לפני תחילת הטיפול אם הגך סובל מפניקלסטרומיה (פגם בייצור אנזים פניאלגין הידרוקסילאז הגורם להצטברות

כמויות גדולות של פניאלגין).

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עלך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אתה בטוח.

המינון המוקבל בדרך כלל הוא:

להקלת צרבת:

קשישים ומבוגרים מעל גיל 12: לטע או המס כפה 1-2 טבליות עם הפועת הצרבת, או לפי המלצת הרופא.

אין לצרור ליעלה מ-15 טבליות ביום.

ילדים בגילאים 6-12:

לטע או המס כפה 1 טבליה עם הפועת הצרבת.

אין לצרור יותר מ-4 טבליות ביום. אין להשתמש במינון המסימלי יותר משבועיים, אלא בהמלצה ובפיקוח הרופא. אם אל חל שיפור בצרבת תוך שבועיים יש לפנות לרופא.

כתוספת סידן:

ילדים, מבוגרים: עד 4 טבליות ליום. יש ליטול את התרופה שעה עד שעה וחצי אחרי הארוחה.

תרופה זו אינה מיועדת לילדים מתחת לגיל 6.

אין לעבור על המנה המומלצת.

בדיקות ומעקב:

בימוינים מומשר (בהוראת רופא), ו/או בימוינים גבוהים ו/או כאשר הגך סובל מבעיות בבלים יש לערוך בדיקות רמת סידן וזרחן כדלם ובשתן.

אם נטלת יותר מ-10 או אם בטעות בלע ידל מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מל של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן הדרוש, אין ליטול מנה כפולה. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל והיוועץ ברופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שגהך נוטל תרופה. רכב משקפים אם הגך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברקוח.

4. תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה, השימוש בצרבת X טבליות עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא שימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאל אחת מהן.

- בחילות, כאבי בטן, עצירות, גזים, יהוקים
- פלקס קיבתי-יושטי (זחזה של חומצת קיבה) לאחר הרקלה ראשונית של התסמינים.
- תגובה אלרגית (רגישות) והיצרות

הסימפטומ (ברוכוספוז).

אם אחת תופעות הלוואי מתמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא הזכרה בעלון, עלך להתייעץ עם הרופא.

5. איך לאחסן את התרופה?

מען הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ לרישי ידם של ילדים ו/או לתינוקות ועל ידך תמנע הרעלה. אל תגורם להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

אחסן באריזה המקורית, במקום יבש, מתחת ל-25°C

6. מידע נוסף:

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

Tzarevet X - Mint Flavour chewable tablets: Mannitol, Povidone (K-25), Sodium starch glycolate, Magnesium stearate, Aspartame, Peppermint flavour

Tzarevet X - Melon Flavour chewable tablets: Mannitol, Povidone (K-25), Sodium starch glycolate, Magnesium stearate, Melangor Flavour, Aspartame, Quinoline Yellow E104, FD&C Blue NO.1 Lake

כיצד רגישות התרופה ומה תוכן האריזה?

אריזה המכילה 1, 2, 3, 6, 12, 18, 24, 36 טבליות ליעסה ארוזות במגשיית. לאל כל גלדי האריזות עשויים להיות משוקקים.

צרבת X טבליות ליעסה בטעם מנטה:

כל טבליה ליעסה הינה בצבע גבן, עגולה עם גומה, עם ריח מנטה אופייני.

צרבת X טבליות ליעסה בטעם מלון:

כל טבליה ליעסה הינה בצבע צהוב-ירוק, עגולה עם גומה, עם ריח מלון אופייני.

בעל הרישום נכתבו: כצט תעשיות כימיות בע"מ, קרית מלאי


עלון זה נבדק ואשרש י" משרד הבריאות בתאריך: דצמבר 2014.

מספר רישום התרופה בנסק התרופות המלכתית במשרד הבריאות:

צרבת X בטעם מנטה מס' רישום: 1311430847

צרבת X בטעם מלון מס' רישום: 1311730850

שלש הפטשות ולהקלת הקריאה, עלוה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.



LFL 009 03/15